


Коричневий мармуровий клоп *Halyomorpha halys* Brown Marmorated Stink bug'

Коричневий мармуровий клоп пошкоджує плодові (груша, яблуна, персик, абрикос, черешня), субтропічні (цитрусові, хурма, інжир, маслина), ягідні (виноград, шовковиця, шипшина, вишня, обліпіха), горіхоплідні (ліщина, або фундук), овочеві (томат, огірок, перець, баклажан), зернові та зернобобові (кукурудза, пшениця, ячмінь, соя, горох, нут, квасоля), декоративні деревні культури (павловнія, катальпа, айлант, магнолія, падуб, церцис, платан і ін.) і лісові породи (клен, ясен та ін.).

Типовий клоп-щитник. Забарвлення коричневе, але на верхній стороні тіла і голови чергуються темні і світлі плями, що візуально створює мармуровий малюнок. Характерною відмінністю крім забарвлення є світлі кільця на вусиках, яких немає у схожих клопів.

Зимують дорослі особини в людських оселях і будівлях. Клопи проникають в оселі через щпарини, де в теплі перецікують холодну пору року.

В лісостепу та поліссі клоп розвивається в трьох поколіннях протягом року: перше покоління – з I декади травня (яйцекладки) по II-III декади червня; друге покоління – з II-III декади червня по I декаду серпня; третє покоління – з I декади серпня по I декаду жовтня, потім імаго переходять в зимову діапаузу.



Ознаки пошкодження рослин

